


新生儿早夭




婴儿早夭指的是婴儿在出生一周内死亡。2000年全球共有三百万早夭婴儿，2.3%的婴儿生下来以后会在一周内死去。

头一个星期的婴儿死亡率从日本的千分之一跨度到毛里塔尼亚的二十分之一之间。

根据世界卫生组织报告，造成新生儿早夭的主要元凶有三个：生产时窒息，新生儿体重过轻（包括早产）以及产后感染。通过妇幼保健的途径可以降低新生儿死亡机率。

各地区的面积大小表示2000年全球新生儿死亡率的地区间分布状况。新生儿早夭指的是婴儿在出生一周内死亡。



土地面积


技术提示

- * 数据来源于世界卫生组织的2005年世界卫生报告；
- * *14个国家和地区的数据显示每千例顺产婴儿中只有2例早产死亡(奥地利, 挪威, 芬兰, 冰岛, 摩纳哥和圣马力诺没有列入表中), 有4个地区的新生儿死亡率低于千分之三十八(埃塞俄比亚, 几内亚和中非共和国没有列入表中), 表中之列出了拥有最多新生儿的国家和地区。
- * 请参考本网站中更多详细信息。

最高和最低的新生儿早夭率的国家和地区

排序	国家和地区	数值	排序	国家和地区	数值
1	毛里塔尼亚	52	185	法国	2
2	利比里亚	48	185	德国	2
3	伊拉克	46	185	韩国	2
4	阿富汗	45	185	意大利	2
5	象牙海岸	44	185	西班牙	2
6	塞拉利昂	42	185	比利时	2
7	尼日利亚	40	185	瑞典	2
7	马里	40	185	捷克	2
7	安哥拉	40	199	新加坡	1
10	巴基斯坦	38	199	日本	1

2000年每千例顺产婴儿中在初生一周内死亡的人数*



“We must count newborn deaths and make them count, instead of accepting these deaths as inevitable.”
 (“我们应该记得死亡的新生儿使其得到重视，而不是认为这类死亡是不可避免的。”)

Francisco Songane, 2006